



# Informe Epidemiológico Vacinação contra COVID Monjolos - MG



Núcleo de Apoio à  
Saúde da Família

## PAINEL DE VACINAÇÃO DEZEMBRO 2021

PÚBLICO VACINADO	1ª dose	2ª dose	Única	Reforço
PROFISSIONAIS DE SAÚDE	69	70	*	54
90+	12	12	*	11
85 A 89	23	21	*	52
80 A 84	50	50	*	
75 A 79	65	64	*	120
70 A 74	80	80	*	
65 A 69	115	115	*	
60 A 64	104	100	*	62
PROF. SEGURANÇA	6	6	*	
SÍNDROME DE DOWN	2	2	*	
HEMODIÁLISE	1	1	*	
COMORBIDADES	188	185	*	
NECESSIDADES ESPECIAIS	38 (BPC) 26 S/ BPC = 64	63	*	
TRABALHADORES DA EDUCAÇÃO	56	55	*	
GESTANTES E PUÉRPERAS	7	7	*	
CAMINHONEIROS/RODOVIÁRIOS	7	6	4	
TRABALHADORES INDUSTRIAIS	37	35	*	
LIMPEZA URBANA	20	20	*	
POPULAÇÃO GERAL 50 A 59	153	146	3	
POPULAÇÃO GERAL 40 A 49	164	159	28	
POPULAÇÃO GERAL 30 A 39	192	174	*	
POPULAÇÃO GERAL 18 A 29	277	256	*	
ADOLESCENTES 12 A 17	176	109	*	
	1868	1736	35	299
	<b>3604</b>		<b>35</b>	<b>299</b>

## VACINA COVID-19: ORIENTAÇÕES PÓS-VACINA



### QUAIS EVENTOS ADVERSOS PODEM OCORRER APÓS RECEBER A VACINA COVID-19?

As reações adversas mais frequentemente reportadas foram:

- ✓ Sensibilidade no local da injeção;
- ✓ Dor no local da injeção, cefaleia, fadiga;
- ✓ Mialgia, mal-estar;
- ✓ Febre, calafrios;
- ✓ Artralgia, náusea.



### O QUE FAZER SE APRESENTAR ALGUM EVENTO ADVERSO?

#### Reações locais:

- ✓ Administrar analgésico, caso necessário;
- ✓ Aplicar compressa fria nas primeiras 24-48h após a vacinação, nos casos de dor local;
- ✓ Não há contraindicação para a dose subsequente (D2).

#### Febre:

- ✓ Manter repouso, ambiente ventilado, administrar água e outros líquidos adequados;
- ✓ Pode ser considerado o uso de antitérmico;
- ✓ Não há contraindicação para a dose subsequente (D2).
- ✓ Anafilaxia (reação alérgica grave):